


HARTFUNCTIE

Het gebruik van Isordil® en Nitroglycerinespray®

Bij angina pectoris (pijn op de borst)

ADVIES



Het gebruik van Isordil® en Nitroglycerinespray® bij angina pectoris

Deze folder informeert u over het gebruik van de medicijnen Isordil® en Nitroglycerinespray® bij pijn op de borst (angina pectoris).

Wat is angina pectoris?

Angina pectoris voelt als een drukkende pijn achter uw borstbeen, en soms alsof er een knellende band om uw borst zit. Vaak gaat dit samen met pijn in uw linkerarm, in uw kaken en soms uitstralend naar uw rug of schouderbladen. Angina pectoris kan ook kortademigheid veroorzaken. De pijn zit niet vast aan de ademhaling. Angina pectoris komt in aanvallen. Deze klachten treden vaak op bij inspanning, bij emoties of opwindung, na een zware maaltijd of als u opeens van warmte in kou komt.

Oorzaak van angina pectoris

De klachten kunnen het gevolg zijn van vernauwingen in de kransslagaderen die het hart van bloed voorzien. Het gevolg van de vernauwingen is dat een gedeelte van het hart minder voorzien wordt van bloed, en dus minder zuurstof krijgt.

De pijnaanvallen veroorzaken geen blijven-

de schade aan het hart zelf; maar het zijn wel waarschuwingen dat de bloedvoorziening van het hart niet optimaal is.

Wat is de werking van deze medicijnen

Isordil® en Nitroglycerinespray® verwijden de vaten in uw lichaam, en dus ook de vaten rondom het hart. Hierdoor hoeft het hart minder hard te werken. De zuurstofbehoefte van de hartspeer wordt verminderd en de zuurstoftoevoer van het hart wordt verbeterd. De pijn op de borst neemt gewoonlijk binnen enkele minuten af.

Wanneer gebruikt u deze medicijnen

U kunt Isordil® of Nitroglycerinespray® gebruiken zodra u pijn op de borst, of andere hierboven beschreven klachten krijgt. Sommige mensen gebruiken Isordil® of Nitroglycerinespray® ook om klachten te voorkomen. Als u weet dat u bij een bepaalde inspanning pijn op de borst krijgt, kunt u vlak voor die inspanning Isordil® of nitroglycerinespray® gebruiken (bijv. traplopen).

Bijwerkingen

Behalve de vaten rond het hart, worden ook andere bloedvaten in uw lichaam wijder door het gebruik van Isordil® of Nitroglycerinespray®. Sommige mensen voelen het bloed in hun hoofd kloppen, anderen krijgen hoofdpijn. Ook kan uw bloeddruk lager worden, waardoor u duizelig wordt. Vooral als u deze medicijnen net gebruikt kunt u last krijgen van deze klachten.

Het veilig bewaren van deze medicijnen

Uw voorraad Isordil® of Nitroglycerinespray® dient bij kamertemperatuur (15–25°C) en buiten invloed van licht te worden bewaard. Isordil® of Nitroglycerinespray® kan worden gebruikt tot de datum die op de verpakking is vermeld onder "houdbaar tot:...". Na die datum is het niet zeker, dat Isordil® of Nitroglycerinespray® de verwachte werking heeft. U kunt de Isordil® of Nitroglycerinespray® ook in de koelkast

bewaren. Hoe koeler u het bewaart, des te langer blijft het houdbaar. Bewaar Isordil® of Nitroglycerinespray® buiten bereik van kinderen.

Wat te doen bij pijn op de borst?

- Ga zitten of liggen i.v.m. mogelijke duizeligheidsklachten.

Isordil®

- Leg een tabletje Isordil® 5 mg onder de tong.
- Het tabletje niet fijnkauwen, of geheel doorslikken. Het tabletje werkt dan het snelst.
- Binnen 10 min. moeten de pijnklachten weg zijn.
- Zo niet, herhaal de handeling.
- Binnen 10 min na de 2e dosis moeten de pijnklachten weg zijn.
- Als de pijnklachten 10 min na de 2e dosis nog niet weg zijn, bel dan uw huisarts. In geval van nood belt u 112.

Nitroglycerinespray®

- Spray één keer de Nitroglycerinespray® onder de tong.
- Spray voor gebruik één maal in de lucht, zodat u zeker weet of de verstuiver werkt. De spray mag voor gebruik niet worden geschud.
- Binnen 10 min. moeten de pijnklachten weg zijn.
- Zo niet, herhaal de handeling.
- Binnen 10 min na de 2e dosis moeten de pijnklachten weg zijn.

- Als de pijnklachten 10 min na de 2e dosis nog niet weg zijn, bel dan uw huisarts. In geval van nood belt u 112

U dient altijd enkele tabletten Isordil® of een flesje Nitroglycerinespray® bij u te dragen. Dit voor het geval dat u onverwachts pijn op de borst krijgt.

Tot slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over het gebruik van deze medicijnen vraag dan inlichtingen aan uw huisarts, cardioloog of verpleegkundige.



St Antonius Ziekenhuis

Telefoon 088 – 320 30 00
voorlichting@antoniusziekenhuis.nl
www.antoniusziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp

088 – 320 33 00

Hartfunctie

088 – 320 11 00

Locaties St Antonius Ziekenhuis

Nieuwegein

Koekoekslaan 1

Utrecht Oudenrijn

Van Heuven Goedhartlaan 1

Utrecht Overvecht

Paranadreef 2

Utrecht Veldhuizen (Kaakchirurgie)

Van Lawick van Pabstlaan 12
De Meern

Utrecht Vleuterweide

Utrechtse Heuvelrug 130-132
Vleuten


Houten

Hollandsspoor 5

Meer weten?

Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl

Dit is een uitgave
van Patiëntenvoorlichting



ZIEKENHUIS
RESEARCH & DEVELOPMENT
ACADEMIE

ST ANTONIUS