

Inname antibiotica bij kinderen

Uw kind heeft antibiotica voorgeschreven gekregen vanwege een (mogelijke) infectie door een bacterie. Deze antibiotica kan alleen maar effectief werken als het op de goede manier wordt ingenomen. Dat betekent dat de juiste hoeveelheid moet worden gegeven, op het juiste moment en vooral de kuur volledig moet worden afgemaakt.

Bij kinderen kan het weleens een uitdaging zijn om het drankje of de pillen in te laten nemen, zeker als ze ziek zijn. Als het niet lukt om de antibiotica binnen te krijgen (bijvoorbeeld door extreme weigering) of binnen te houden (bijvoorbeeld binnen 30 minuten na inname weer uitspugen) willen we u vragen contact op te nemen met de Kinder- en jeugdafdeling.

In dat geval kunnen we samen met u bekijken wat het beste is om te doen. Het type infectie en de ernst van de infectie, het type antibioticum en de leeftijd van het kind zijn allemaal van invloed op die beslissing. Er zijn soms meerdere mogelijkheden:

- Een Medisch Pedagogisch Zorgverlener of kinderverpleegkundige kan uw kind helpen het antibioticum toch in te nemen (vreemde ogen en ervaren handen helpen soms).
- Soms kunnen we het antibioticum omzetten naar een ander type dat wellicht minder vies is of makkelijker in te nemen is.
- Ook is het soms mogelijk om het antibioticum in injectievorm te geven (1x per dag).
- Of het antibioticum met behulp van een neus-maagsonde aan het kind te geven in het ziekenhuis (dit betekent doorgaans opname).
- Ook is het soms mogelijk het antibioticum per infuus via de bloedbaan aan het kind te geven in het ziekenhuis (dit betekent doorgaans ook een opname).

Bijwerkingen

Soms ontstaan er bijwerkingen bij het gebruik van antibiotica. Deze bijwerkingen kunnen verschillen per specifiek antibioticum, hiervoor kunt u kijken op de bijsluiter. De reactie op antibiotica verschilt per persoon.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Tijdelijke maagdarmklachten (misselijkheid/ diarree/ krampen).
- Luierslag (met schimmelinfectie); dit komt veel voor bij jonge kinderen die nog een luier dragen. Preventief smeren met zinkzalf (witte billenzalf) en wat vaker een nieuwe luier om doen kan dit voorkomen

Zeldzame reacties:

- Overgevoeligheid
- Allergische reactie (huiduitslag of jeuk)

Contact opnemen:

- Als er naast huiduitslag ernstige bijwerkingen optreden, bv acute benauwdheidsklachten, moet u met spoed contact met ons opnemen via 088 320 63 00 of 112 bellen
- Als het thuis wel goed lukt om de antibiotica in te nemen, maar uw kind knapt niet of onvoldoende op binnen 48 uur, vragen we u ook om contact met ons op te nemen via 088 - 32 63 00

Meer informatie

Indien u vragen of zorgen heeft graag contact opnemen met het volgende telefoonnummer: T 088 - 320 92 14.

Gerelateerde informatie

Specialismen

- Kindergeneeskunde (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/kindergeneeskunde>)

Contact Kindergeneeskunde

T 088 320 63 00