

## Plaveiselcelcarcinoom (vorm van huidkanker)

Bij ongeveer 20% van de mensen met huidkanker gaat het om een plaveiselcelcarcinoom. Deze vorm van huidkanker komt vooral voor bij mensen van 60 jaar en ouder.

Het plaveiselcelcarcinoom groeit sneller dan het [basaalcelcarcinoom](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3698) [https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3698]. Als er niet behandeld wordt, kan een plaveiselcelcarcinoom uitzaaïen. Dat gebeurt meestal via de lymfeklieren in de buurt van de tumor.

Het plaveiselcelcarcinoom is daardoor kwaadaardiger dan het basaalcelcarcinoom. Maar als de behandeling vroegtijdig plaatsvindt, zijn de vooruitzichten eveneens erg gunstig.

## Meer over plaveiselcelcarcinoom (vorm van huidkanker)

Naast het plaveiselcelcarcinoom bestaan er ook andere vormen van huidkanker, zoals:

- Het basaalcelcarcinoom [https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3698]
- Het melanoom [https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3744]
- Premaligne huidafwijkingen [https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3742]

Op de [pagina Huidkanker](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3734) [https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3734] vindt u meer informatie over deze ziekte.

## Symptomen

Het plaveiselcelcarcinoom komt vooral voor op plaatsen die veel blootstaan aan zonlicht, zoals het gezicht en de rug van de hand. Soms ontardt een voorstadium van een kwaadaardige afwijking van de huid in een plaveiselcelcarcinoom.

Een plaveiselcelcarcinoom ziet er veelal anders uit dan een [basaalcelcarcinoom](https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3698) [https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/3698]. Meestal begint een plaveiselcelcarcinoom als een roze-rood knobbeltje, soms met een schilferend korstje erop. Als dit korstje wordt afgestoten, blijft er een oppervlakkig zweertje achter dat niet geneest. De karakteristieke parelachtige glans en de verwijde bloedvaatjes van het basaalcelcarcinoom ontbreken. Vooral hierdoor kan men klinisch vaak al het verschil zien tussen het basaalcel- en het plaveiselcelcarcinoom.

Een plaveiselcelcarcinoom aan de lippen is nogal eens te herkennen als een beginnende witte plek die langzaam wat dikker wordt en ook korstjes vertoont. Vroegtijdige ontdekking en behandeling is hierbij van extra groot belang vanwege de verhoogde kans op het ontstaan van uitzaaïingen van het plaveiselcelcarcinoom op deze plek.

## Behandelingen

Heeft de specialist het vermoeden dat u huidkanker hebt, dan zal er vaak een stukje van het weefsel moeten worden verwijderd. Meestal gebeurt dit onder plaatselijke verdoving. Deze ingreep noemt men een biopsie.

Mensen met een plaveiselcelcarcinoom krijgen meestal een operatie, soms moet er worden bestraald. Een enkele keer wordt bevriezing [cryotherapie] toegepast. Als er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren in de buurt van het gezwel, worden deze operatief verwijderd of bestraald.

### Overzicht behandelingen huidkanker

Zie:

<https://www.antoniuziekenhuis.nl/dermatologie/behandelingen-en-onderzoeken/huidkanker-behandelingen>

Alle behandelingen op een rij

### Huidafwijkingen

Zie: <https://www.antoniuziekenhuis.nl/chirurgie/behandelingen-onderzoeken/huidafwijkingen-verwijderen>  
Informatie over het verwijderen

## Expertise en ervaring

Klik op de tegels voor meer informatie over onze expertise en ervaring.

## Preventie en advies

Voor de lange termijn kunt u het risico op een nieuwe huidtumor beperken door zo voorzichtig mogelijk te zijn met blootstelling van uw huid aan ultraviolette straling. Dit geldt uiteraard in sterkere mate als u een lichte huid heeft. Enkele adviezen:

- Draag in de volle zon kleding en een zonnehoed, pet of zonneklep. Als u, bijvoorbeeld beroepsmatig, toch veel en langdurig in de zon komt, kunt u het beste uw armen en benen bedekt houden.
- Vermijd de zon zo veel mogelijk tussen 12.00 en 15.00 uur (zomertijd). Dan is de ultraviolette straling namelijk het sterkst.
- Ga zo min mogelijk zonnen of onder de zonnebank.
- Het is raadzaam tijdens zonnige perioden een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor [SPF, skin protectie factor] te gebruiken.

### Wat kunt u zelf doen?

Naast de controle van uw huid door de specialist, doet u er goed aan ook zelf uw huid in de gaten te houden. Het is beslist niet nodig uw huid elke dag te onderzoeken. Eens in de twee à drie maanden uw huid nauwkeurig op veranderingen bekijken, is voldoende.

Daarbij moet u letten op:

- Veranderingen in en rond het litteken.
- Nieuwe plekje op een tot dan toe gave huid.
- Veranderingen in al bestaande plekjes.
- Voor patiënten die zijn behandeld vanwege een plaveiselcelcarcinoom of een melanoom, afhankelijk van de plaats van de behandelde tumor:
  - Zwellingen van klieren in bijvoorbeeld de hals, de oksels of de liezen.

Als u één of meer van deze veranderingen opmerkt, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of uw afspraak bij uw specialist vervroegen.

## Begeleiding en advies

Al u de diagnose plaveiselcelcarcinoom krijgt, kan dat veel emoties en ongerustheid oproepen. In ons team zitten onder anderen gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om mensen met kanker te begeleiden en zijn uw vaste aanspreekpunt. U kunt bij hen terecht voor advies en met al uw vragen en zorgen.

### Psychosociale begeleiding

Als u de diagnose plaveiselcelcarcinoom krijgt, kan dit uw leven ingrijpend kan verstoren. Door de ziekte en behandeling(en) kunt u te maken krijgen met situaties waarmee u geen raad weet, ook wanneer de behandeling al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Wij kunnen u (verschillende) ondersteunende zorg bieden bijvoorbeeld door een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorgers, consultatief psychiatisch verpleegkundige, psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, diëtist, seksuoloog, revalidatiearts of een palliatief team.

Het is belangrijk om uw problemen en vragen met uw specialist en/of verpleegkundige te bespreken, zodat zij met u kunnen kijken welke hulpverlener u het beste kan helpen.

Lees hier meer over [psychosociale begeleiding bij kanker \(#behandelingen Psychosociale begeleiding\)](#).

## Revalidatie

Een plaveiselcelcarcinoom kan grote gevolgen hebben. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten. Uw conditie gaat achteruit. Misschien bent u moe, angstig of onzeker. Sommige mensen hebben pijn, of kunnen zich minder goed concentreren. Herkent u deze klachten en/of wilt u klachten voorkomen of beperken? Dan kan revalidatie zinvol zijn.

Lees hier meer over [onze revalidatieprogramma's \(#behandelingen Revalidatie bij kanker\)](#).

## Meer informatie

### Websites

Aanvullende informatie over huidkanker vindt u op:

- KWF Kankerbestrijding (<https://www.kwf.nl/>)
- Huidinfo.nl (<http://www.huidinfo.nl>)

## Gerelateerde informatie

### Aandoeningen

- Huidkanker (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/dermatologie/aandoeningen/huidkanker>)
- Basaalcelcarcinoom (vorm van huidkanker)  
(<https://www.antoniusziekenhuis.nl/dermatologie/aandoeningen/basaalcelcarcinoom-vorm-van-huidkanker>)
- Melanoom (vorm van huidkanker)  
(<https://www.antoniusziekenhuis.nl/dermatologie/aandoeningen/melanoom-vorm-van-huidkanker>)
- Premaligne huidafwijkingen (actinische keratosen)  
(<https://www.antoniusziekenhuis.nl/dermatologie/aandoeningen/premaligne-huidafwijkingen-actinische-keratosen>)

### Specialismen

- St. Antonius Kankercentrum (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/kankercentrum>)
- Plastische Chirurgie (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/plastische-chirurgie>)

Contact Dermatologie

T 088 320 54 00