


REUMATOLOGIE

# Goudinjecties

(Tauredon® = Aurothiomalaat)

BEHANDELING



# Goudinjecties

## (Tauredon® = Aurothiomalaat)

Uw reumatoloog heeft u goudinjecties voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet.

### Het effect van goudinjecties

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken. Deze noemen we reumabestrijdende medicijnen. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. Een goudinjectie is zo'n medicijn. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat de injecties eventueel beginnen te werken. Als u al pijnstillers gebruikt kunt u deze blijven gebruiken. Als de goudinjecties een gunstig effect hebben, kunt u ze jarenlang blijven gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last hebt van bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik van goudinjecties stop te zetten.

### Samenstelling

Goudinjecties bevatten een oplossing van aurothiomalaat.

### Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u goudinjecties in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Als u goudinjecties gebruikt samen met bloedverduunners van de trombosedienst, zoals sintrom(mitis) of marcoumar® heeft u op de plaats van de injectie meer kans op een blauwe plek. Vertel uw huisarts en uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

### Wijze van toediening

De goudinjecties worden u op de poli Reumatologie of door uw huisarts (of haar/zijn assistente) óf door een wijkverpleegkundige toegediend in de spieren van uw bil. In het begin krijgt u 1 goudinjectie per week.

Vaak is na verloop van tijd 1 injectie per maand voldoende als onderhoudstherapie.

## Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiters van de apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen.

De meest voorkomende bijwerkingen van goudinjecties zijn:

- jeuk en huiduitslag;
- ontstekingen in het slijmvlies van de mond, zoals pijnlijke plekkjes;
- erge keelpijn in combinatie met koorts, herhaaldelijk een bloedneus en snel blauwe plekken (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak);
- eiwit in de urine. Soms merkt u dat uw urine gaat schuimen, vaak echter merkt u hier niets van. Wel kan dit worden aangetoond bij urineonderzoek.



Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

- ontstekingen van het mondslijmvlies;
- erge keelpijn in combinatie met koorts;
- herhaaldelijk een bloedneus;
- snel blauwe plekken.

Als u veel last hebt van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van goudinjecties. Bijwerkingen zijn ook soms reden voor het aanpassen van de dosis en/of de frequentie van de goudinjecties. Stoppen is meestal niet nodig. Mocht u stoppen, noteer dan wel op welke dag de laatste injectie gegeven is en waarom u bent gestopt. Neem bij twijfel contact op met uw reumatoloog.

## Controles

Om bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig uw bloed en urine laten onderzoeken. Dit gebeurt in het begin meestal één keer per drie injecties. Later kunnen de controles minder frequent worden uitgevoerd. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

## Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Voor zover tot op heden bekend is, hebben goudinjecties waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. Omdat het nog niet zeker is of goudinjecties veilig zijn voor het ongeboren kind, kunt u deze medicijnen beter niet gebruiken tijdens een zwangerschap. Vrouwen moeten drie maanden voor een

eventuele zwangerschap stoppen met het gebruik van de injecties. Het is dus belangrijk om tijdens deze periode en tijdens het gebruik van goudinjecties een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken.

Mannen met kinderwens kunnen de injecties blijven gebruiken.

U kunt beter geen goudinjecties gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden. Overleg indien nodig met uw apotheker.

## Aanvullende informatie

- Het gebruik van alcohol in de periode dat u goudinjecties gebruikt heeft geen ongunstige invloed op de werking van het medicijn.
- Bewaar geneesmiddelen altijd zó dat kinderen er niet bij kunnen.
- Als u ampullen overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. De vloeistof wordt dan op een verantwoorde manier vernietigd.

## Vragen

Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met uw reumatoloog. U vindt het telefoonnummer in het adreskader achterin deze folder.


*bron: Jan van Breemen Instituut, Amsterdam*



## Meer weten?

Ga naar [www.antoniusziekenhuis.nl](http://www.antoniusziekenhuis.nl)

Dit is een uitgave  
van St. Antonius Ziekenhuis



INT 14/05-'13

ZIEKENHUIS  
RESEARCH & DEVELOPMENT  
ACADEMIE

ST ANTONIUS

