een santeon ziekenhuis

Entyvio (Vedoluzimab) bij IBD

Entyvio wordt onder andere gebruikt voor volwassen patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, die niet meer goed reageren op andere medicatie. Het is een sterk middel, dat soms belangrijke bijwerkingen kan hebben. Daarom is het belangrijk daarvan op de hoogte te zijn.

Werking

Entyvio is een gehumaniseerd IgG1-monoklonaal antilichaam (stof die een belangrijke rol speelt bij ernstige ontsteking van de darm). Het middel werkt in de actieve fase van de ziekte en als onderhoudsbehandeling.

Voorzorgen

Omdat Entyvio de afweer vermindert tegen bepaalde infecties, wordt er voor de start van de behandeling nagegaan of er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid daarvan:

- Er wordt een röntgenfoto van de longen, een bloedtest en een huidtest gedaan in verband met tuberculose(TBC).
- Er wordt bloedonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het hepatitis B virus.
- Soms kan het nodig zijn nadere onderzoeken te doen om eventuele aanwezigheid van een abces of hartfalen uit te sluiten.

Infusen en dosering

U krijgt Entyvio via een infuus (300 mg). Dit duurt ongeveer 35 minuten. Hiervoor komt u naar de Dagbehandeling 4B in Utrecht. De eerste 6 keer dat u het medicijn krijgt, blijft u na afloop nog 30 minuten op de dagbehandeling ter observatie. Vanaf uw zevende infuus, mag u direct na toediening naar huis.

Vaak krijgt u Entyvio volgens dit schema:

- 2 weken na uw eerste infuus krijgt u uw tweede infuus Entyvio.
- 4 weken daarna krijgt u uw derde infuus.
- Daarna krijgt u elke 8 weken een infuus

Uw arts kan hiervan afwijken.

Bijwerkingen en acties

Het middel heeft vele mogelijke bijwerkingen, echter niet vaak ernstige. Bij het optreden van bijwerkingen dient men snel de verpleegkundige of specialist te waarschuwen.

Onderstaande bijwerkingen kunnen voorkomen:

- **Acute reacties tijdens/vlak na infuus;** (soms ernstige) allergische reactie, roodheid, jeuk, huiduitslag, kortademigheid, pijn op de borst, rillingen, koorts; maatregelen kunnen nodig zijn, zoals infuus langzamer laten lopen, tijdelijk onderbreken of stoppen, eventueel tegen-medicijnen toedienen.
- **Pijn op de plaats waar de infusie wordt toegediend;** mogelijk opnieuw infuusnaald inbrengen.
- **Allergische reactie later;** huiduitslag, koorts, rode huid, verkoudheid, zwelling van handen of gezicht, jeuk, galbulten, keelpijn en/of hoofdpijn.
- **Infecties: soms snel uitbreidend in het lichaam;** (hoge) koorts, snel zieker worden, koorts> 38,5C koude rillingen of beven, sufheid, kortademigheid, hoest, warme rode pijnlijke huid.
- **Misselijkheid.**
- **Neurologische klachten;** wazig zien, verlies van gezichtsvermogen of dubbel zien, problemen met praten, zwakte in arm of been, een verandering in de manier van bewegen, aanhoudend doof gevoel, geheugenverlies of verwardheid.

Bloedcontroles

Om bepaalde bijwerkingen vroeg op te sporen wordt na 3 maanden bloedonderzoek gedaan. Daarna wordt dit zo nodig op verzoek van de specialist of verpleegkundige gedaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens het gebruik van Entyvio mag men niet zwanger worden of borstvoeding geven omdat er nog onvoldoende gegevens zijn over het effect van het middel op zwangerschap of borstvoeding.

Voor mannen met een kinderwens geldt hetzelfde advies.

Aanvullend

- Tijdens gebruik van Entyvio niet vaccineren met levende vaccins, zoals tegen Bof-Mazelen-Rode hond, Varicella (waterpokken, gordelroos) en sommige tropische ziektes.
- Veel gebruikte vaccins als DKTP, influenza (griep) en hepatitis A en B zijn vermoedelijk geen probleem.

Gerelateerde informatie

Specialismen

- Maag-Darm-Lever (MDL) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/maag-darm-lever-mdl)

Contact Maag-Darm-Lever (MDL) **T 088 320 56 00**