


Letrozol

Letrozol is een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van hormoongevoelige borstkanker. Het behoort tot een groep medicijnen die aromataseremmers worden genoemd.

Deze informatie is een aanvulling op de informatie die u van uw arts en/of verpleegkundig specialist krijgt.

Meer over de werking van letrozol

Veel vormen van borstkanker groeien onder invloed van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Na de overgang of als de eierstokken zijn verwijderd of geblokkeerd, maakt het lichaam nog kleine hoeveelheden oestrogeen aan via een enzym dat aromatase heet. Letrozol blokkeert dit enzym. Hierdoor wordt de aanmaak van oestrogeen sterk verminderd. Zo wordt de groei van borstkankercellen vertraagd of zelfs gestopt.



Anti-hormonale behandelingen:

- Verwijderen van de eierstokken (ovariectomie): zo kunnen deze geen hormonen aanmaken.
- Anti-hormonen (anti-oestrogeen) blokkeren de hormoonreceptoren, zodat hormonen de kankercellen niet kunnen beïnvloeden.
- Aromataseremmers: remmen de omzet naar hormonen door aromatase (enzym).
- LHRH-analogen stimuleren de oestrogeenproductie zo veel dat de eierstokken 'overbelast' raken en stoppen met de aanmaak van hormonen.

Toediening

- U neemt letrozol 1 x per dag in, gedurende de periode die de arts met u heeft besproken.

- Neem de medicatie elke dag op hetzelfde tijdstip in.

Dosis vergeten?

Ben u een dosis medicijnen vergeten? Handel dan als volgt:

- Komt u hier binnen 8 uur na het gebruikelijke innametijdstip achter? Neem uw medicijn dan zo snel mogelijk alsnog in.
- Komt u er op een later tijdstip achter (meer dan 8 uur na het normale innametijdstip)? Neem de vergeten dosis dan **niet** meer in.

Bijwerkingen

Tijdens de behandeling met letrozol kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

- Overgangsverschijnselen (opvliegers, transpiratie etc.)
- Botontkalking
- Gewrichtsklachten/stijfheid, vooral in de ochtend
- Vasthouden van vocht (oedeem)
- Droge vagina
- Verminderd seksueel verlangen
- Vermoeidheid

U mag geen supplementen met fyto-oestrogenen gebruiken. Deze kunnen de werking van exemestaan verminderen.

Wanneer waarschuwt u de verpleegkundig specialist/arts?

Krijgt u last van bijwerkingen die u niet acceptabel vindt, dan raden we u aan om dit enkele dagen tot een week aan te kijken. Verdwijnen de bijwerkingen niet? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over uw medicijnen?

U kunt met vragen over uw medicijnen altijd terecht bij uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Betrouwbare aanvullende informatie over medicijnen vindt u op deze websites:

- [Apotheek.nl](https://www.apotheek.nl) (<https://www.apotheek.nl>): voor heldere schriftelijke informatie.
- [Kijksluiter.nl](https://www.kijksluiter.nl) (<https://www.kijksluiter.nl>): voor duidelijke animatiefilmpjes over veelgebruikte medicijnen. Na het invullen van enkele gegevens ontvangt u een inlogcode.

Gerelateerde informatie

Aandoeningen

- Borstkanker (mammacarcinoom)
(<https://www.antoniusziekenhuis.nl/aandoeningen/borstkanker-mammacarcinoom>)

Behandelingen & onderzoeken

- Anti-hormonale therapie bij borstkanker
(<https://www.antoniusziekenhuis.nl/behandelingen-onderzoeken/hormoontherapie-bij-borstkanker>)

Specialismen

- Welkom bij ons Borstcentrum (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/borstcentrum>)
- Kankercentrum (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/kankercentrum>)

Contact Ziekenhuis

T 088 320 30 00