


INTERNE GENEESKUNDE

Synacthen®-test (ACTH-test)

ONDERZOEK



U wordt op [] dag [] om [] uur verwacht op de poli/afdeling [].

- Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken?
- Wij verzoeken u om 15 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn in verband met de administratieve afhandeling.

Synacthen®-test (ACTH-test)

Binnenkort krijgt u een onderzoek naar de werking van uw bijnieren. Dit heet een Synacthen®- of ACTH-test. In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek. U leest hoe u zich erop kunt voorbereiden en wat u ervan kunt verwachten.

Deze folder beschrijft het onderzoek in grote lijnen. Wij kunnen niet alle details voor elke situatie beschrijven. De folder is dan ook bedoeld als extra informatie, naast het gesprek met de arts en/of de verpleegkundige. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Wat houdt dit onderzoek in?

Bovenop uw nieren liggen uw bijnieren. Deze maken onder andere het hormoon cortisol aan. Dit hormoon is belangrijk voor de stofwisseling en voor de manier waarop het lichaam op stress en infecties reageert.

De stof ACTH stimuleert uw bijnieren om tijdelijk extra cortisol aan te maken. Door te kijken hoe uw bijnieren reageren op ACTH, kan uw arts zien of ze goed werken.

Het onderzoek bestaat uit twee stappen:

- U krijgt ACTH (Synacthen®) toegediend (via een infuus).

- Later wordt een paar maal bloed bij u afgenomen, om te kijken hoeveel cortisol het bevat.

Voorbereiding

Het onderzoek duurt ongeveer twee uur.

Daarna mag u weer naar huis.

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u op de dag van het onderzoek niet mag ontbijten en niets mag drinken. U mag na afloop van het onderzoek pas weer eten en drinken.



Gebruikt u medicijnen? Overleg dan met uw internist of u deze voor het onderzoek tijdelijk moet stoppen.

De dag van het onderzoek

Als u in het ziekenhuis komt, kunt u zich melden bij de informatiebalie en vragen naar de afdeling Interne Geneeskunde. Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. U kunt in een gesprek ook eventuele vragen stellen over de test.

Het onderzoek

Infuus

De verpleegkundige meet uw bloeddruk en hartslag [pols]. Daarna krijgt u een infuus.

Dat is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat. Het infuus is nodig om de ACTH toe te dienen en om bloed af te kunnen nemen. Daarvoor hoeft u dus niet extra geprikt te worden.

Nadat het infuus is ingebracht, wordt er meteen wat bloed bij u afgenomen.

De ACTH

Na een kwartier wordt er nogmaals wat bloed afgenomen. Daarna krijgt u de ACTH toegediend via het infuus.

Bloedafname

Nadat u de ACTH hebt gekregen, wordt elk half uur wat bloed bij u afgenomen. In totaal twee keer.

Na het onderzoek

De test is nu afgelopen. U mag weer gewoon eten en drinken. De verpleegkundige zal u iets te eten en/of te drinken aanbieden.

Het infuus wordt verwijderd en u kunt weer naar huis.

De uitslag

Na ongeveer twee weken krijgt u de uitslag van het bloedonderzoek van uw internist, tijdens een bezoek aan de poli.

Het kan zijn dat u al een afspraak voor dit bezoek hebt. Als dat niet zo is, kan de verpleegkundige een afspraak voor u laten maken.

Verhinderd?

Mocht u uw afspraak willen veranderen of afzeggen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven, maar in elk geval minstens 24 uur van tevoren. U vindt de contactgegevens in het adreskader achterin deze folder. Er kan dan iemand anders in uw plaats worden geholpen.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Interne geneeskunde. U vindt de contactgegevens in het adreskader achterin deze folder.



St. Antonius Ziekenhuis

T 088 - 320 30 00

E patienteninformatie@antoniusziekenhuis.nl


www.antoniusziekenhuis.nl

Notities:

Meer weten?

Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl

Dit is een uitgave
van St. Antonius Ziekenhuis



INT 46/09-J10

ZIEKENHUIS
RESEARCH & DEVELOPMENT
ACADEMIE

ST ANTONIUS

