

Acroniem	Titel	Doel	Monocenter/Multicenter
FLAIR2	Forced oscillation technique: a novel method to monitor pulmonary fibrosis	Minimal clinical important difference van impuls-oscillometrie onderzoeken bij ongeveer 125 patiënten met longfibrose. De resultaten van herhaaldelijke metingen in 3 jaar tijd zullen vergeleken worden met de reguliere longfunctie metingen.	WMO, monocenter, MH
DOPPIO	Deliver mOre aPplications for more durable Pulmonary vein Isolation, the DOPPIO trail.	Pulmonaal vene isolatie middels pulsed field ablation wordt vergeleken met een procedure waarbij enkele extra applicaties per vene worden gegeven. Hierbij wordt gekeken of de vrijheid van atriale ritmestoornissen kan worden verbeterd, terwijl de bijwerkingen van hogere PFA-doseringen worden vermeden.	WMO, multicenter, MH
PSMA Detect	The Added Value of PSMA PET/CT-guided biopsies in Detecting Clinically significant Prostate Cancer Compared to Systematic Biopsies in MRI-Negative or equivocal Cases	Het doel van het onderzoek is uitzoeken of een PSMA PET-scan beter is in het opsporen van agressievere vorm van prostaatkanker als een MRI van de prostaat geen of twijfelachtige afwijking laat zien terwijl uw prostaathormoon (PSA) in het bloed wel verhoogd is.	WMO, monocenter
INFINITE trial	Implementation of fluorescent imaging using indocyanine green to identify sentinel lymph nodes during surgery for breast cancer	Het doel van deze studie is succesvolle implementatie van Indocyanine groen voor het lokaliseren van de SWK via een incisie in de oksel bij patiënten met borstkanker en condities creëren voor nationale uitrol.	WMO, multicenter

		Het primaire doel van de studie is om het effect van geslacht te bestuderen ten aanzien van de farmacokinetiek van 2 dd 25mg metoprolol in patiënten na een CABG met klepchirurgie en patiënten met een NSTEMI/STEMI. Het secundaire doel is om het effect te bepalen van het geslacht op de effecten van metoprolol alsmede de bijwerkingen, inclusief eventuele dosisaanpassingen en stoppen van de metoprolol. Hierbij wordt er eveneens gekeken naar patiëntkarakteristieken zoals leeftijd, indicatie en CYP2D6	WMO, monocenter
DoseMeLoI	DosemeLoL - Exploring differences in metoprolol concentrations between sexes, a pilot study	3D models in virtual reality (VR) may enhance anatomical understanding and improve pre-operative planning. This study aims to prospectively evaluate the clinical impact of the use of 3D models in VR in the preoperative planning of partial and radical nephrectomies	WMO, monocenter
Virtual Renality	Virtual Renality: Assessing the impact of Virtual Reality on preoperative planning in renal cancer surgery	spijtmateriaal in een biobank voor de ontwikkeling, optimalisatie, multiplexen, validatie en evaluatie van bestaande en nieuwe Liquid Diagnostics testen en matrix bronnen, waarvoor geen toereikende CE-IVD / IVDR test	WMO, monocenter
Rest- en spijtmateriaal voor liquid biopsy	Het gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal voor de opzet, validatie en (door)ontwikkeling van liquid diagnostics testen.	Doelstelling is dat we uiteindelijk willen we zoveel mogelijk patiënten 'aan boord' houden om optimale zorg te kunnen leveren aan moeder en kind, gedurende de zwangerschap en tot na de bevalling. Daarvoor moet duidelijk moet worden hoe kan voorkomen worden dat patiënten afhaken. Literatuur geeft aan dat drang leidt tot weerstand, afhaken en negatieve reacties.	niet-WMO light
Drangtoepassing op de POP-poli	Drangtoepassing op de POP-poli: ervaringen van professionals en patiënten		

Een katheter, weet je het zeker?!	Doen of laten: infusen en katheters.	Vermindering van geplaatste infusen en katheters zonder terechte indicatie om zo risico op katheter/infuus gerelateerde complicaties te voorkomen. Inzicht krijgen in de omvang van het probleem; het aantal infusen en katheters zonder terechte indicatie.	niet-WMO light
Patiënten met cardiale sarcoidose met een ICD	Patiënten met cardiale sarcoidose met een ICD	Kijken of we met de data die we middels home monitoring krijgen van de ICD bij kunnen dragen aan vroege herkenning van CS In juni 2022 is het proces rondom het uitvoeren van de sedatiestop en uitvoering van SBT bij invasief beademde patiënten op de intensive care geoptimaliseerd waarbij de richtlijnen en beschikbare evidence wordt toegepast in de dagelijkse praktijk, met als doel het verkorten van de beademingsduur.	niet-WMO light
SAT/SBT	Awake and Breathe		niet-WMO light
Praktijkgericht onderzoek Wensen en behoeften bij patiënten met RCC en ossale uitzaaiingen	Praktijkgericht onderzoek naar de ervaringen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden rondom het samen beslissen Ervaringen en behoeften van patienten ossaal gemetastaseerd niercelcarcinoom m.b.t begeleiding en ondersteuning om de kwaliteit van leven te verbeteren tijdens de	Het in kaart brengen van de ervaringen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden met betrekking tot de informatie en begeleiding die zij ontvangen met als doel te onderzoeken op welke manier deze doelgroep beter betrokken kan worden bij het "Samen beslissen". Nagaan wat de wensen en behoeften zijn van deze patiënten en mogelijk de zorg daarop aanpassen	niet-WMO light

Het doel van dit onderzoek is om tussen juni 2025 en juni 2026, op basis van een literatuuronderzoek (≥10 artikelen), dossieranalyse (50 dossiers) en enquêtes (30 patiënten, 10 zorgverleners), te evalueren in hoeverre het huidige nuchter beleid bij pacemaker- en ICD-implantaties in het Sint-Antonius Ziekenhuis aansluit bij evidence-based richtlijnen en praktijkbehoeften, en om minimaal drie onderbouwde aanbevelingen te formuleren voor optimalisatie van dit beleid		niet-WMO light
Evaluatie van het nuchter beleid bij CIED-implantaties in het Sint-Antonius	Evaluatie van het nuchter beleid bij CIED-implantaties in het Sint-Antonius	niet-WMO light
Houdbaarheidscandities na afname omtrent de bepaling van serotonine in bloedmonsters	Houdbaarheidscandities na afname omtrent de bepaling van serotonine in bloedmonsters	
Dit onderzoek is toegespitst op houdbaarheidsomstandigheden van afgenomen bloed om een goed bloedonderzoekresultaat te kunnen rapporteren.		niet-WMO advies
Het effect van PRF behandelingen voor pijnlijke mono neuropathieën	Het effect van PRF behandelingen voor pijnlijke mono neuropathieën: een retrospectieve studie	niet-WMO advies

In dit masteronderzoek zal gekeken worden naar de effectiviteit van gepulseerde radiofrequente behandelingen bij patiënten met een pijnlijke mononeuropathie door middel van een retrospectief status onderzoek. Dit zal gedaan worden over de jaren 2018, 2019 en 2020 in het St. Antonius ziekenhuis, het Jsselland ziekenhuis en het Erasmus MC. Door middel van het filteren van de pijn behandelprogramma's op mogelijke PRF behandelcodes zullen de patiëntcasussen geïdentificeerd worden. Van de te include

PORSCH	Postoperative infections and antibiotic use after pancreatic resection: a post hoc analysis of a stepped-wedge nationwide randomized trial – a PORSCH study-	Het doel is om een breed beschrijvend overzicht te krijgen van profylactisch en therapeutisch antibioticagebruik en infectieuze complicaties in de context van pancreas chirurgie in Nederland.	niet-WMO advies
effect goal directed perfusion op nierfunctie	Impact van zuurstofaanbod en verbruik tijdens cardiopulmonary bypass op postoperatieve nierfunctie	Het effect van verschillende parameters voor zuurstof aanbod en verbruik op nierfunctie wordt retrospectief onderzocht. Data, gecollecteerd vanuit de hartlong machine, worden gekoppeld aan biomarker data van een andere lopende studie	niet-WMO advies
FICB	Effect van het Fascia iliaca compartment block bij patiënten met een heupfractuur op de pre-operatieve morfine consumptie.	Het doel van deze studie is om retrospectief te onderzoeken of patiënten die een FICB met Levobupivacaine 0.50% krijgen, een lagere preoperatieve morfineconsumptie hebben in vergelijking met patiënten die deze regionale anesthesietechniek niet ontvangen.	niet-WMO advies
PCCT for PAVMs	Photon Counting-CT in Diagnostics and Follow-up for Pulmonary Arteriovenous Malformations (PAVMs)	Deze pictorial review heeft als doel de voordelen van PCD-CT bij de diagnostiek en follow-up van PAVM's te illustreren.	niet-WMO advies
SSENDT	An exploration of the effect of stimulus selection on measurement quality in psychophysics	Dit onderzoek betreft de NDT-EP meetmethode, waarvan onderzocht wordt welke factoren effect hebben op de meetkwaliteit. Verschillende variaties van de originele meetmethode worden toegepast.	niet-WMO advies

		Onderzoek heeft aangetoond dat Physiologically Based Cord Clamping bijdraagt aan de cardiovasculaire transitie tijdens geboorte. Dit is van belang voor premature- en vitaal bedreigde neonaten. Daarom is de CBT ontwikkelt. In dit retrospectieve cohort onderzoek worden de toepasbaarheid en uitkomst van neonaten opgevangen op deze geboortetafel geanalyseerd. Dit betreft een retrospectief mono-center dossieronderzoek naar de verwijzingen in 2023-2024 van longgeneeskunde naar oogheelkunde van patiënten met een (vermoeden van) sarcoïdose.	niet-WMO advies
POCON-studie	Physiologic Based Cord Clamping using the Concord Birth Trolley: Feasibility in level II Hospital and Effect on Neonatal Outcomes		
	Incidentie oogheelkundige klachten en afwijkingen bij verwezen patiënten met (verdenking van) sarcoïdose		
SarcOOG	BPA in dagbehandeling; onderzoek naar patiëntervaringen, kosten en veiligheid	Hoe ervaren patiënten (en hun familieleden) een dagopname na BPA in vergelijking tot één nacht observatie na BPA?	niet-WMO advies
Bariatrische chirurgie bij vrouwen van vruchtbare leeftijd	Effectiviteit en lange termijn complicaties van de Roux-en-Y gastric bypass versus de sleeve gastrectomie bij vrouwen in de fertiele levensfase	Vergelijken van uitkomsten van de gastric bypass en de gastric sleeve bij vrouwen van vruchtbare leeftijd. Dit betreft een retrospectief observationeel multicenter onderzoek. Patiënten ≥ 18 jaar waarbij een TAVI procedure is verricht tussen januari 2022 maart 2025 worden geïnccludeerd. Deze studie beschrijft hierbij de patiënt- en procedurele karakteristieken, periprocedurele- en 30-dagen uitkomsten	niet-WMO advies
Single operatorship TAVI	Single operatorship in transfemoral transcatheter aortic valve implantation (TAVI) procedures: a retrospective observational two center study		niet-WMO advies
DOAC Natural Experiment	A prospective natural experiment on blood transfusion risk after early vs. delayed surgery in geriatric hip fracture patients on direct oral anticoagulants	Een prospectieve cohortstudie waarin vroege (<24u) en uitgestelde (>24u) chirurgie bij geriatrische heupfractuurpatiënten op DOACs worden vergeleken op bloedtransfusierisico, via een natural experiment tussen ziekenhuizen met verschillende behandelprotocollen	niet-WMO advies

Complicaties van de TFNA bij perthrochantaire femurfracturen	Blade cut-out and proximal nail breakage of the TFN-Advanced Proximal Femoral Nailing System in treatment of perthrochanteric femoral fractures	Retrospectieve studie waarbij wordt gekeken naar de complicaties van de TFNA in het St. Antonius ziekenhuis en het OLVG, waaronder het breken van de pen en de verschuiving van de blade richting het acetabulum.	niet-WMO advies
PAK	Validation of Patient Reported Experience Measurement survey, PREM of acute asthma in children	validatie van een eerder ontwikkelde vragenlijst, zogenaamde PREM. De PREM is specifiek ontwikkeld voor kinderen die worden opgenomen op de kinderafdeling van 3 Santeon Ziekenhuizen met een acute astma aanval	niet-WMO advies
LEAD-VALUE: leaders in value-based healthcare	Leiderschapsrollen in Aandoeningsgerichte Teams	Dit onderzoek verkent praktijkervaringen van leiders in aandoeningsgerichte teams binnen waardedreven zorg. Via interviews worden hun taken, verantwoordelijkheden en competenties vergeleken met bestaande profielschetsen, om zo leiderschapsprofielen te verbeteren en ziekenhuizen te ondersteunen bij het selecteren van geschikte leiders.	niet-WMO advies
HIP-CARE	Hip Injury Palliative Care in Residential Environment	Vergelijking van kwaliteit van leven tussen patiënten die in een instelling wonen met een (verdenking) heupfractuur en wel óf niet worden ingestuurd naar een ziekenhuis.	niet-WMO advies
Surveillance history in patients treated for BE-related neoplasia	Surveillance history in patients treated for Barrett related dysplasia or esophageal adenocarcinoma	in behandelde patiënten voor Barrett gerelateerde neoplasie kijken welk aandeel van de neoplasie uit de Barrett surveillance is gediagnostiseerd en welke aandeel een diagnose Barrett gelijktijdig met neoplasie had.	niet-WMO advies

FDG-PET/CT in Bethesda 1 thyroid nodules	The role of FDG-PET/CT in Thyroid Nodules with a Bethesda I after Fine Needle Aspiration: A Retrospective Study Conducted in the Netherlands	Gezien de beperkte beschikbare gegevens over Bethesda 1-noduli, is het ons doel om de integratie van FDG-PET/CT in de diagnostische analyse van deze schildkliernoduli te evalueren. Ons primaire doel is om onnodige diagnostische operaties voor benigne noduli te minimaliseren en surveillance te vermijden voor noduli die als kwaadaardig of borderline zijn gecategoriseerd, waarvoor doorgaans chirurgische resectie vereist is.	niet-WMO advies
Geometric Radiomics	Applicability of machine learning geometric radiomics on bi-parametric magnetic resonance imaging in predicting patient outcomes after radical prostatectomy	Onderzoeken of geometrische radiomics (kwantitatieve metingen van de vorm en afmetingen van een tumor op MRI-beelden) een voorspellende waarde hebben op oncologische uitkomsten na radicale prostatectomie.	niet-WMO advies
Cryoballoonablatie als salvage behandeling	Cryoballoon ablation as salvage therapy for esophageal dysplasia or cancer: a case series	Cryoballoonablatie als profylactische behandeling voor niet-radicaal resectie, kanker met hoog-risico karakteristieken of recidief dysplasie/kanker in het resectie litteken waarvoor geen additionele chirurgie danwel chemoradiatie wordt gegeven. De behandeling wordt met dit onderzoek geëvalueerd.	niet-WMO advies
STAM-NL	Autologous hematopoietic Stem cell Transplantation Abroad as treatment for Multiple sclerosis in patients in the NetherLands: a retrospective cross-sectional study	mensen met multiple sclerose die voor een stamceltransplantatie naar het buitenland zijn gegaan. Hierbij worden medische gegevens opgevraagd over het ziektebeloop bij de huidige en vroegere behandelaars van de MS en worden er vragenlijsten gestuurd. De deelnemers krijgen zes vragenlijsten, waarvan vijf gestandaardiseerde vragenlijsten en een zelfgemaakte vragenlijst specifiek over stamceltransplantatie in het buitenland.	niet-WMO advies

Three-Dimensional right ventricular dimensions and function in Pulmonary arterial Hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension	3D-echocardiografie de rechterhartfunctie bij PAH- en CTEPH-patiënten, bij diagnose en na behandeling, om inzicht te krijgen in behandelingseffecten en zo de zorg voor deze patiëntengroep te verbeteren.	niet-WMO advies
--	--	-----------------

3D-PH-HEART