

## Laxeren thuis met PleinVue® (500 milliliter)

Deze aanvullende informatie is voor patiënten die zich thuis voorbereiden op een endoscopisch onderzoek met het laxeermiddel PleinVue®.

Hieronder vindt u informatie over het thuis laxeren met PleinVue®.

### Vorbereiding

Om de darm goed te kunnen beoordelen, moet de darm schoon en leeg zijn. Daarom is het nodig om een aangepast dieet te volgen, een voorgeschreven laxeermiddel te gebruiken en veel te drinken.

#### 3 dagen voor het onderzoek start u met een aangepast dieet

U mag 3 dagen voor het onderzoek geen vruchten, brood, crackers en dergelijke met pitten en zadjes eten. Deze blijven namelijk nog dagen in de darmen zitten en verstoppen zo de endoscoop.

Hieronder ziet u wat u **NIET** mag eten 3 dagen voor het onderzoek:

#### Wat mag u 3 dagen voor het onderzoek NIET eten?

Brood met zaden/pitten en volkorenbrood

Volkoren en meergranen pasta en zilvervliesrijst

Asperges, bleekselderij, zuurkool, snijbonen, sperziebonen, prei, doperwten, peulvruchten, taugé, maïs, champignons, tomaten, ui, knoflook, spinazie, andijvie, paprika of rauwkost

Sinaasappel, grapefruit, mandarijnen, kiwi's, bramen, druiven, aardbeien, gedroogde vruchten

Jam met pitjes

Noten en pinda's

#### 1 dag voor het onderzoek start u met PleinVue®

#### Hoe gebruikt u PleinVue®?

- Iedere verpakking van PleinVue® bevat 3 zakjes.
- Dosis 1 is één groot sachet. Deze dosis heeft een mangosmaak.
- Dosis 2 bevat twee sachetsverpakking; Dosis 2 sachet A & B. Deze sachets zitten aan elkaar gelijmd en hebben samen een fruitdranksmaak.
- **Voor dit onderzoek hoeft u alleen dosis 1 te nemen.** De andere 2 zakjes (dosis 2) hoeft u dus niet in te nemen
- Dosis 1 lost u op in 500 ml water. U blijft roeren tot het is opgelost. Dit kan mogelijk 10 minuten duren.
- U kunt desgewenst de vloeistof in een afgesloten kan, in de koelkast bewaren tot max 6 uur na bereiden.
- Het kan zijn dat de smaak van PleinVue® u tegenstaat. U kunt het volgende proberen:
  - Drink het koud uit de koelkast.
  - Drink het met een rietje, zodat de vloeistof wat verder in de mond komt.
  - Gebruik tussendoor sorbitolvrije kauwgom.

- Gebruik kauwgom tussendoor en tijdens het drinken.
- Voeg een scheutje limonadesiroop toe (siroop zonder sorbitol).
- Voeg eventueel nog wat extra heldere vloeistof toe aan de oplossing om het gemakkelijker te kunnen opdrinken.
- Tijdens de voorbereiding is het belangrijk dat u voldoende heldere dranken drinkt. De volgende heldere dranken, zonder vet en zonder koolzuur (prik) zijn toegestaan:
  - koffie en thee: suiker is toegestaan, melk is niet toegestaan;
  - vruchtensappen zonder vezels, zoals appelsap, gezeefd sinaasappelsap, gezeefd grapefruitsap;
  - ice tea;
  - gezeefde, niet vette bouillon of gezeefde niet vette heldere soep;
  - (mineraal)water zonder koolzuur, limonades zonder koolzuur.
- **Drink geen alcohol, melk, rode of paarse vloeistoffen of andere dranken die vezels/pulp bevatten!**

### Als u het onderzoek heeft voor 12.00 uur

*Bijvoorbeeld: het onderzoek vindt plaats op donderdag om 10.00 uur, dan geldt onderstaande voor de woensdag ervoor.*

#### 1 dag voor het onderzoek

Vanaf 19.00 uur mag u geen vast voedsel meer eten. Wel mag u heldere dranken drinken.

Tussen 20.00 en 21.30 uur: Neem 500 ml PleinVue®-oplossing (= dosis 1). Drink rustig en met kleine slokjes.

Tussen 21.30 en 22.00 uur: Drink minimaal 500 ml (maar bij voorkeur 1 liter) heldere dranken.

Vanaf 22.00 uur: Drink naar behoefte, maar blijf wel heldere dranken drinken. **Eet niets!**

#### Dag van het onderzoek

Blijf naar behoefte heldere dranken drinken. **Eet Niets!**

Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer drinken (ook geen slokjes water!). **U moet vanaf dan dus compleet nuchter zijn!**

### Als u het onderzoek heeft na 12.00 uur

*Bijvoorbeeld: het onderzoek vindt plaats op donderdag om 15.00 uur, dan geldt onderstaande voor de woensdag ervoor.*

#### 1 dag voor het onderzoek

U hoeft de dag voor het onderzoek nog **niet te starten** met PleinVue®.

U mag eten en drinken zoals gebruikelijk.

#### Dag van het onderzoek

Tot 07.00 uur mag u een licht ontbijt (beschuit, 1-2 sneetjes wit brood, thee of koffie).

Vanaf 07.00 uur mag u geen vast voedsel meer eten. Wel mag u heldere dranken drinken.

Tussen 09.00 en 09.45 uur: Neem 500 ml PleinVue®-oplossing (= dosis 1). Drink rustig en met kleine slokjes.

Tussen 09.45 en 10.30 uur: Drink minimaal 500 ml (maar bij voorkeur 1 liter) heldere dranken.

Vanaf 10.30 uur kunt u naar behoefte heldere dranken blijven drinken tot **uiterlijk 2 uur** voor het onderzoek.

Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer drinken (ook geen slokjes water!). **U moet vanaf dan dus compleet nuchter zijn!**

## Zorg dat u in de buurt bent van een toilet

Om de darm goed schoon te krijgen, heeft u een darmreinigingsmiddel (laxeermiddel) gekregen dat diarree veroorzaakt. In de loop van de tijd zal er veel ontlasting komen. Zorg dat u in de buurt blijft van een toilet.

Het is ook mogelijk dat het wat langer duurt voor uw ontlasting op gang komt. Op het laatst is de ontlasting zo dun als water. Hier kunt u buikkrampen bij hebben.

Wanneer de darmreiniging goed gelukt is, komt er alleen nog maar heldere, soms licht gele vloeistof in het toilet. Zie ook onderstaande afbeelding. U bent dan klaar voor het onderzoek.



## Gerelateerde informatie

### Behandelingen & onderzoeken

- Videocapsule-onderzoek dunne darm (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/videocapsule-onderzoek>)

### Specialismen

- Maag-Darm-Lever (MDL) (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/maag-darm-lever-mdl>)

Contact Maag-Darm-Lever (MDL)

T 088 320 56 00