een santeon ziekenhuis

Voorbereiding om reactie op contastvloeistof te voorkomen

Na een eerdere ernstige reactie

Bij sommige onderzoeken op de afdeling Radiologie wordt contrastvloeistof gebruikt. Mensen die eerder een matige of ernstige reactie op de twee contrastvloeistof hebben gehad krijgen vooraf medicijnen om een reactie te voorkomen.

Voorbereiding

Medicijnen

De behandelend arts geeft u een recept mee voor:

- 2 tabletten van 25 mg Prednison/ Prednisolon
- 1 tablet 2 mg Clemastine (Tavegyl®).

Deze middelen remmen de overgevoelige reactie die (mogelijk) bij u kan ontstaan.

Innameschema:

- 12 uur voor het onderzoek 1 tablet van 25mg Prednison
- 2 uur voor het onderzoek 1 tablet van 25 mg Prednison
- 2 uur voor het onderzoek 1 tablet van 2 mg Clemastine (Tavegyl®)

Voor meer informatie over de medicatie zie:

- Prednison (https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/prednison)
- Clemastine (https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/clemastine)

Vervoer regelen

Na het innemen van Clemastine (Tavegyl®) mag u 24 uur niet deelnemen aan het verkeer. Het is belangrijk dat u iemand regelt die u naar het ziekenhuis brengt en weer ophaalt.

Nazorg

Na het onderzoek blijft u nog 30 minuten in de wachtruimte van de afdeling Radiologie wachten. Mocht er een reactie optreden, dan kunnen we u direct helpen.

Na 30 minuten mag u naar huis toe.

Mocht u thuis een reactie krijgen, dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Bijwerkingen

- Clemastine (Tavegyl®) kan uw reactievermogen beïnvloeden. U mag daarom de eerste 24 uur na het onderzoek niet deelnemen aan het verkeer.
- Clemastine (Tavegyl®) versterkt de werking van alcohol.

Contact Radiologie **T 088 320 80 00**